


QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

1 – LES DYSFONCTIONS ÉRECTILES SECONDAIRES À LA RADIOTHÉRAPIE :

- *Apparaissent en majorité lors de la première année*..... ☐
- *Concernent à terme environ 65% des patients*..... ☐
- *Sont en règle résistantes au sildénafil*..... ☐


• **COMMUNICATION****DR J.-L. ACHARD**

CLERMONT-FERRAND

- *Pour accéder au diaporama de la communication*



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

2 - QUEL EST LE TAUX MAXIMAL DE RÉCUPÉRATION DE LA FONCTION ÉRECTILE APRÈS PROSTATECTOMIE RADICALE AVEC CONSERVATION NERVEUSE ?

- 28% ☐
- 51% ☐
- 76% ☐


• **COMMUNICATION****DR P. COSTA**

NÎMES

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

3 – LA RÉÉDUCATION ACTIVE PAR IIC DE PGE1 :

- *Est initiée avec des doses de 1 µg à 2 µg*..... ☐
- *Doit être pratiquée 1 à 2 fois par semaine*..... ☐
- *Est idéalement réalisée avec 3 IIC/semaine*..... ☐


• **COMMUNICATION****DR F. GIULANO**

PARIS

- *Pour accéder au diaporama de la communication*



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

4 – UN SUJET EST CONSIDÉRÉ COMME AYANT UNE « PUISSANCE » SEXUELLE NORMALE :

- *Lorsque la moitié de ses pénétrations sont satisfaisantes*..... ☐
- *Lorsque plus des 3/4 de ses pénétrations sont satisfaisantes*..... ☐
- *Lorsque toutes ses pénétrations sont satisfaisantes*..... ☐


• **COMMUNICATION****DR B. GUILLONNEAU**

NEW YORK

- *Pour accéder au diaporama de la communication*



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

5 - APRÈS HIFU AVEC CONSERVATION NERVEUSE, QUELLE PROPORTION DE PATIENTS ONT RECOUVRÉ SPONTANÉMENT (SANS AIDE PHARMACOLOGIQUE) UNE FONCTION SEXUELLE NORMALE À 1 AN :

- 32% ☐
- 56% ☐
- 70% ☐

• **COMMUNICATION**


DR D. CHEVALLIER

NICE

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

6 - QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE L'ORGASMURIE APRÈS PROSTATECTOMIE RADICALE ?

- 38% ☐
- 69% ☐
- 93% ☐

• COMMUNICATION


DR O. MONTAIGNE

LILLE

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

7 - QUEL EST LE TEMPS MOYEN D'OBTENTION DE L'EFFET DE CASTRATION APRÈS BLOCAGE ANDROGÉNIQUE ?

- 2 à 4 mois ☐
- 4 à 6 mois ☐
- 6 à 8 mois ☐


• **COMMUNICATION****DR A. FAIX**

MONTPELLIER

- Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION


8 – QUELLE EST LA PREMIÈRE CAUSE DE DYSFONCTION SEXUELLE FÉMININE APRÈS 60 ANS ?

- *Manque d'intérêt* ☐
- *Défaut de lubrification* ☐
- *Dyspareunie* ☐


• **COMMUNICATION****DR L. SAVAREUX**

BEAUMONT

- *Pour accéder au diaporama de la communication*



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

9 - APRÈS PROSTATECTOMIE RADICALE, LA RÉCUPÉRATION ÉRECTILE SE FAIT EN RÈGLE GÉNÉRALE :

- Dans l'année suivant l'intervention..... ☐
- Dans les 2 ans post-opératoires..... ☐
- Après 2 ans post-opératoires..... ☐

• COMMUNICATION


DR L. WAGNER

NÎMES

- Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

10 - LE PRINCIPAL MÉCANISME DE LA DYSFONCTION ÉRECTILE POST-PROTATECTOMIE EST :


- *Neurologique* ☐
- *Vasculaire* ☐
- *Tissulaire fibreux* ☐

• COMMUNICATION


DR L. WAGNER

NÎMES

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

11 – LA PRÉVENTION DES DYSFONCTIONS SEXUELLES APRÈS TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE LOCALISÉ REPOSE SUR :

- *La conservation systématique des nerfs caverneux*..... ☐
- *La rééducation pharmacologique*..... ☐
- *La mise en traction quotidienne en post-opératoire du pénis par Vacuum*..... ☐

• **COMMUNICATION**

DR S. DROUPY

LE KREMLIN BICÊTRE

- Pour accéder au diaporama de la communication

