

IMPÉRIOSITÉ MICTIONNELLE



Pierre Fabre
Médicament

EN PARTENARIAT AVEC



Association
Française
d'Urologie

OK 784696 - 09/2006

F M C

IMPÉRIOSITÉ MICTIONNELLE

DÉFINITION

GÉNÉRALITÉ

INTERROGATOIRE

EXAMEN CLINIQUE

EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES

ÉTIOLOGIE



CTMH - AFU

Comité des Troubles
Mictionnels de l'Homme

L'impériosité mictionnelle
(ou urgenturie), ou miction
impérieuse est **la survenue**
d'un besoin urgent, soudain et
irrésistible d'uriner.

IMPÉRIOSITÉ MICTIONNELLE



Pierre Fabre
Médicament

EN PARTENARIAT AVEC



Association
Française
d'Urologie

- L'impériosité **peut entraîner une perte involontaire d'urines** (incontinence urinaire par impériosité).
- L'impériosité **peut être déclenchée par le froid, l'eau ou le retour au domicile** (syndrome de la clef dans la porte).
- L'impériosité **est souvent associée à une pollakiurie diurne et/ou nocturne**.
- L'impériosité **peut être provoquée par toute cause d'irritation vésicale** (tumeur vésicale, calcul, bilharziose, corps étranger...).



Interrogatoire

Rechercher d'autres signes fonctionnels urinaires :

dysurie, pollakiurie, pertes d'urines, force du jet, brûlures mictionnelles, impression de mauvaise vidange urinaire ou non urinaire : troubles digestifs ou neurologiques.

Réaliser un calendrier mictionnel et un score IPSS/Qualité de vie.

Examen CLINIQUE

- Palpation abdominale et des fosses lombaires.
- Examen des organes génitaux et toucher rectal.
- Examen neurologique et proctologique.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

- Bandelette urinaire et ECBU

En fonction du contexte :

- Échographie réno-vésico-prostatique avec mesure du résidu post-mictionnel.
- Abdomen sans préparation (ASP) si besoin.
- Cytologie urinaire.
- Recherche de BK.
- Cystoscopie.

ETIOLOGIE

L'impériosité ou urgenturie peut n'être qu'un symptôme parmi d'autres ou bien accompagner des contractions vésicales desinhibées.

Ces contractions sont mises en évidence lors de la phase de remplissage de la cystomanométrie (lors d'un bilan urodynamique) et sont le témoin d'une hyperactivité du détrusor.

Impériosité ou urgenturie psychogène : sensorielle (froid, eau, émotion, ...) ou réflexe (syndrome de la clef dans la porte.)

Impériosité ou urgenturie organique :

- Rétention vésicale chronique.
- Cystite infectieuse ou interstitielle.
- Corps étranger.
- Calcul vésical ou de l'uretère distal.
- Tumeur vésicale et carcinome in situ (CIS).
- Hypertrophie bénigne de prostate ou cancer de prostate.
- Neuropathie périphérique vésicale dont le diabète.
- Tuberculose.
- Post-radiothérapie pelvienne.