

QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

1 - LE COMPOSANT MAJORITAIRE DES CALCULS CHEZ LA FILLETTE EST :


- *Oxalate de calcium* ☐
- *Phosphate de calcium* ☐
- *Cystine* ☐

• COMMUNICATION

DR M. DAUDON

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

2 - LEQUEL DE CES TYPES ET SOUS-TYPES DE CALCULS N'EST PAS D'ORIGINE GÉNÉTIQUE ?


- Ic ☐
- IIIa ☐
- Va ☐

• COMMUNICATION

DR M. DAUDON

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

3 – A TOUS LES ÂGES DE L'ENFANCE, ON OBSERVE CHEZ LA FILLETTE UNE PROPORTION PLUS ÉLEVÉE DE CALCULS :


- *D'acide urique* ☐
- *Calciques* ☐
- *De cystine* ☐

• COMMUNICATION

DR M. DAUDON

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

4- DANS LES EXPLORATIONS UROLOGIQUES DE L'ENFANT, LES SYSTÈMES VIDÉO INTÉGRÉS :


- *Ont une résolution comparable aux caméras externes*..... ☐
- *Offrent une image 3 fois plus grande*..... ☐
- *Présentent l'inconvénient des « nids d'abeille »*..... ☐

• COMMUNICATION

DR K. BENSALAH

RENNES

- *Pour accéder au diaporama de la communication*



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

5- LE SPECTRE D'ÉMISSION DES LASERS HOLMIUM EST DE :


- 820 nm..... ☐
- 1600 nm..... ☐
- 2100 nm..... ☐

• **COMMUNICATION**

DR J. AMIEL

NICE

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

6 - POUR POUVOIR PROCÉDER À UNE SECTION TISSULAIRE, LA PUISSANCE DU FAISCEAU LASER DOIT ÊTRE D'AU MOINS :

- 8 W ☐
- 20 W ☐
- 60 W ☐

• COMMUNICATION

DR J. AMIEL

NICE

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

7 - LA FRÉQUENCE DES CALCULS URINAIRES CHEZ LES ENFANTS DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS EST DE :


- 1% à 5% ☐
- 8% à 12% ☐
- 30% ☐

• COMMUNICATION

DR H. LOTTMANN

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

8 – QUELLE EST LA TAILLE SEUIL AU DESSUS DE LAQUELLE LES CALCULS DE L'ENFANT VONT EN GÉNÉRAL NÉCESSITER UNE INTERVENTION POUR LES ÉLIMINER ?


- 2 mm ☐
- 4 mm ☐
- 8 mm ☐

• **COMMUNICATION**

DR H. LOTTMANN

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

9 - QUELLE EST LA TECHNIQUE DE RÉFÉRENCE POUR L'ÉLIMINATION DES CALCULS CHEZ L'ENFANT ?


- LEC..... ☐
- Urétéroscopie..... ☐
- Chirurgie ouverte..... ☐

• COMMUNICATION

DR H. LOTTMANN

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

10 - LA FRÉQUENCE DE SURVENUE D'UN REFLUX VÉSICO-URÉTRAL APRÈS DILATATION INSTRUMENTALE CHEZ L'ENFANT EST DE :


- 2% ☐
- 6% ☐
- 9% ☐

• COMMUNICATION

DR D. DEMÈDE

LYON

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

11 - CHEZ L'ENFANT, LA LITHOTRIPSIE EXTRA-CORPORELLE :

- *Permet d'éviter une anesthésie générale* ☐
- *Peut être réalisée sans adaptation matérielle spécifique* ☐
- *Nécessite un remplissage vésical (calculs pelviens)* ☐

• COMMUNICATION

DR C. LOPEZ

MONTPELLIER

- *Pour accéder au diaporama de la communication*

