

Enquête AFU 2013 sur les recommandations HBP 2012 du CTMH

Enquête évaluant l'impact de la publication en 2012 des recommandations du Comité des Troubles Mictionnels de l'Homme (CTMH) sur la prise en charge de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP)

Cher(e) collègue, cher(e) ami(e),

Le **Comité des Troubles Mictionnels de l'Homme** (CTMH) et le **laboratoire GSK**, partenaire de cette enquête, vous seraient très reconnaissants de prendre 5 minutes de votre temps pour compléter ce questionnaire visant à évaluer l'impact qu'a eu éventuellement sur votre pratique quotidienne la publication en 2012 des **recommandations du CTMH sur la prise en charge de l'hyperplasie bénigne de la prostate** (HBP).

Par avance merci à vous.

Aurélien Descazeaud et les membres du CTMH

Il y a 28 questions dans ce questionnaire

Données démographiques

[] Vous exercez principalement votre activité ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- dans un centre hospitalier
- dans un CHU
- dans un établissement mutualiste ou ESPIC
- en clinique privée
- encore en formation (interne ou chef de clinique)
- Autre

[] Quel est votre classe d'âge ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- < 40 ans
- Entre 40 et 50 ans
- Entre 50 et 60 ans
- > 60 ans

Recommandations HBP 2012 du CTMH

[]Avez-vous lu les recommandations HBP 2012 du CTMH parues dans Progrès en Urologie ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
 Non

[]Respectez-vous la nouvelle terminologie de l'HBP du CTMH 2012 dans vos échanges avec vos correspondants ? *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

	Oui	Non
"Hyperplasie" vs "Hypertrophie"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
"Symptômes du Bas Appareil Urinaire (SBAU)" vs "Troubles Urinaires du Bas Appareil (TUBA)"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
"Phase mictionnelle et post mictionnelle" vs "Symptômes obstructifs"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
"Phase de remplissage" vs "Symptômes irritatifs"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bilan et prise en charge initiale d'une HBP

[] Quels sont les moyens que vous utilisez habituellement pour évaluer les symptômes du patient ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Interrogatoire avec réalisation d'un score symptomatique validé (type IPSS)
- Interrogatoire sans réalisation d'un score symptomatique
- Autre

[] A partir de quel seuil considérez-vous habituellement qu'il existe une augmentation « significative » du volume de la prostate ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- > 30 cc
- > 40 cc
- > 50cc
- > 60 cc
- Autre

[] Prenez-vous en compte systématiquement le volume de la prostate dans votre décision de prise en charge thérapeutique ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
- Non

[] Par quel moyen évaluez-vous habituellement le volume de la prostate ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Toucher rectal
- Echographie endo-rectale
- Echographie sus-pubienne
- PSA
- Autre

[]Évaluez-vous la fonction sexuelle de votre patient ayant une HBP ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui, toujours
- Oui, souvent
- Oui, parfois
- Non

[]Si oui, évaluez-vous la fonction sexuelle de votre patient avec un questionnaire dédié ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse n'était pas 'Non' à la question '9 [09]' (Évaluez-vous la fonction sexuelle de votre patient ayant une HBP ?)

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
- Non

[]Si oui, quel(s) questionnaire(s) utilisez-vous ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '10 [09a]' (Si oui, évaluez-vous la fonction sexuelle de votre patient avec un questionnaire dédié ?)

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- IIEF (International Index of Erectile Function)
- SHIM (Sexual Health Inventory for Men)
- MSHQ (Male Sexual Health Questionnaire)
- DAN-PSS (DANish Prostatic Symptom Score)
- EDITS (Erectile Dysfunction Inventory of Treatment Satisfaction)
- ASEX (Arizona Sexual Experiences Scale)
- Autre:

[]Réalisez-vous systématiquement un PSA à vos patients ayant une HBP ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
- Non

Suivi et traitement du patient HBP

[]Après l'initiation d'un traitement médical en monothérapie, après combien de temps, dans votre pratique courante, réévaluez-vous habituellement le patient ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- le suivi est réalisé par le médecin généraliste
- 3 mois
- 6 mois
- 9 mois
- 12 mois
- > 12 mois

[]Suivez-vous les recommandations 2012 du CTMH par rapport au traitement médical ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui, systématiquement
- Oui, le plus souvent
- Oui, parfois
- Non
- Ne sais pas

[]Si oui, êtes-vous sensible au niveau de preuve des études concernées et aux grades de recommandation de la société savante qui en découle ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui, systématiquement' *ou* 'Oui, le plus souvent' *ou* 'Oui, parfois' à la question '14 [12]' (Suivez-vous les recommandations 2012 du CTMH par rapport au traitement médical ?) *et* La réponse était 'Oui, systématiquement' *ou* 'Oui, le plus souvent' *ou* 'Oui, parfois' à la question '14 [12]' (Suivez-vous les recommandations 2012 du CTMH par rapport au traitement médical ?) *et* La réponse était 'Oui, systématiquement' *ou* 'Oui, le plus souvent' *ou* 'Oui, parfois' à la question '14 [12]' (Suivez-vous les recommandations 2012 du CTMH par rapport au traitement médical ?)

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
- Non

[] Utilisez-vous régulièrement des associations médicamenteuses ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
 Non

[] Si oui, quelle(s) association(s) médicamenteuse(s) utilisez-vous ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '16 [13]' (Utilisez-vous régulièrement des associations médicamenteuses ?)

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- Inhibiteur de la 5-alpha-réductase + Alpha-bloquant
 Alpha-bloquant + Plantes
 Alpha-bloquant + antimuscariniques
 Inhibiteur de la 5-alpha-réductase + Inhibiteur des phosphodiésterases de type 5
 Inhibiteur de la 5-alpha-réductase + Plantes
 Alpha-bloquant + Inhibiteur des phosphodiésterases de type 5
 Autre:

[] Utilisez-vous le dosage du PSA dans le suivi des patients ayant une HBP ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
 Non

[] Si oui, avec quelle fréquence ? (indiquer le nombre de mois) *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '18 [14]' (Utilisez-vous le dosage du PSA dans le suivi des patients ayant une HBP ?)

Veillez écrire votre réponse ici :

Indiquer le nombre de mois

Médecins généralistes

[]Echangez-vous régulièrement avec vos correspondants médecins généralistes ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
 Non

[]Si oui, par quel(s) moyen(s) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '20 [15]' (Echangez-vous régulièrement avec vos correspondants médecins généralistes ?)

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- Réunions type FMC, EPU
 Contacts téléphoniques
 Ecrits (lettres, compte rendus)
 Mails
 Autre:

[]Depuis leur publication, préconisez-vous l'utilisation de ces recommandations auprès de vos confrères généralistes ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
 Non

[] Si oui, par quel(s) moyen(s) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '22 [16]' (Depuis leur publication, préconisez-vous l'utilisation de ces recommandations auprès de vos confrères généralistes ?)

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- Réunions d'Enseignement Post-Universitaire
- Courriers, mails
- Contacts téléphoniques
- Site Web / Réseaux sociaux...
- Remise d'un document dans lequel figure la référence à cette publication
- Autre:

[] Si oui, souhaitez-vous la publication de recommandations adaptées aux médecins généralistes ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '22 [16]' (Depuis leur publication, préconisez-vous l'utilisation de ces recommandations auprès de vos confrères généralistes ?)

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
- Non

Questions complémentaires

[] Savez-vous que l'association fixe dutastéride + tamsulosine est remboursée à un taux inférieur à celui des monothérapies (15% versus 30%) ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
- Non

[] Est-ce, selon vous, un frein à votre prescription ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
- Non

[] Si oui, est-ce un frein : *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '26 [18]' (Est-ce, selon vous, un frein à votre prescription ?)

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- uniquement pour les patients qui ne bénéficient pas du remboursement du complément des 15% par leur mutuelle
- pour tous vos patients

[] Si cette association fixe était remboursée à 30% après 6 mois d'utilisation de l'association libre, la prescririez-vous davantage ? *

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- Oui
- Non

Le **Comité des Troubles Mictionnels de l'Homme** de l'Association Française d'Urologie vous remercie de votre participation à cette enquête.
13/01/2014 – 00:00

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.