

Annexe1. Critères diagnostiques de névralgie pudendale par syndrome canalaire (critères de Nantes)

<p><i>Critères indispensables au diagnostic de névralgie pudendale</i></p> <p>Douleur située dans le territoire du nerf pudental (de l'anus à la verge ou au clitoris) Douleur prédominant en position assise Douleur ne réveillant habituellement pas la nuit Absence de déficit sensitif objectif Bloc diagnostique du nerf pudental positif (sous réserve d'une technique irréprochable)</p>
<p><i>Critères complémentaires au diagnostic</i></p> <p>Sensations de brûlures, décharges électriques, tiraillement, engourdissement Sensation de corps étranger endocavitaire (« sympathalgie » rectale ou vaginale) Aggravation de la douleur au cours de la journée Douleur à prédominance unilatérale Douleurs apparaissant après la défécation Présence d'une douleur exquise à la palpation de l'épine sciatique Données de l'électroneuromyogramme chez l'homme et la femme nullipare</p>
<p><i>Critères d'exclusion</i></p> <p>Douleurs uniquement coccygienne, fessière, pubienne ou hypogastrique Prurit Douleurs uniquement paroxystiques Anomalies d'imagerie pouvant expliquer la douleur</p>
<p><i>Signes associés n'excluant pas le diagnostic</i></p> <p>Irradiation fessière ou au membre inférieur, notamment en position assise Douleur sus-pubienne Pollakiurie et/ou douleurs au remplissage vésical Douleurs apparaissant après l'éjaculation Dyspareunie et/ou douleurs après les rapports sexuels Troubles de l'érection Normalité de l'ENMG</p>