

Fiche Info-Patient



Association
Française
d'Urologie
www.urofrance.org

Dernière mise à jour : mai 2012

KYSTE DU CORDON (EXERESE D'UN)

Cette fiche d'information, rédigée par l'Association Française d'Urologie, est destinée aux patients ainsi qu'aux usagers du système de santé.

Remise lors de votre consultation d'urologie avant de pratiquer un acte à visée diagnostique ou thérapeutique, elle est destinée à vous aider à mieux comprendre l'information délivrée par votre Urologue. Il vous a expliqué la maladie dont vous souffrez ou dont il doit faire le diagnostic. Il vous a exposé les différentes modalités et alternatives de prise en charge et de traitement et les conséquences prévisibles en cas de refus de l'acte proposé.

Vous sont exposées ici les raisons de l'acte que va pratiquer votre urologue, son déroulement, les conséquences habituelles et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Les conditions du suivi après examen ou intervention sont aussi précisées.

Ce document, complémentaire de l'information orale que vous avez reçue, vous permet donc le délai de réflexion nécessaire et une prise de décision partagée avec votre urologue.

L'intervention, qui vous est proposée, a pour objectif d'enlever le kyste à contenu liquidien qui s'est développé au dessus de votre testicule.

Pourquoi cette intervention ?

Un kyste du cordon est une accumulation de liquide dans une « poche » située au dessus du testicule au niveau du cordon spermatique. Ce kyste est responsable d'une augmentation de volume plus ou moins importante dans la bourse.

Il s'agit d'une maladie bénigne qui ne risque ni de s'infecter ni d'évoluer vers une maladie plus grave.

Elle peut en revanche être responsable d'une gêne, de douleurs ou d'un préjudice esthétique.

L'intervention a pour but de rendre à votre bourse un aspect normal et de faire disparaître les symptômes pour lesquels vous avez consulté.

L'absence de traitement vous expose au risque d'augmentation de volume de la bourse avec apparition ou aggravation de la douleur ou de la gêne.

Existe-t-il d'autres possibilités ?

Il n'existe pas de traitement médical du kyste du cordon.

Une ponction du kyste comporte un risque d'infection et d'hématome, et aussi de récurrence rendant le traitement secondaire par chirurgie plus difficile.

Préparation à l'intervention

L'intervention se déroule sous anesthésie générale ou loco-régionale.

Comme pour toute intervention chirurgicale, une consultation d'anesthésie pré-opératoire est nécessaire quelques jours avant l'opération.

Technique opératoire


L'intervention menée par une courte incision au niveau de la bourse consiste à enlever le kyste en ménageant les éléments du cordon spermatique.

Attention :

Fumer augmente le risque de complications chirurgicales de toute chirurgie. Arrêter de fumer 6-8 semaines avant l'intervention élimine ce risque supplémentaire.

Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, votre chirurgien et votre anesthésiste ou appelez la ligne Tabac-Info-Service au 3989 pour vous aider à réduire les risques et mettre toutes les chances de votre côté.

Suites habituelles



L'intervention se fait dans le cadre d'une hospitalisation en chirurgie ambulatoire. Elle peut, dans certains cas, nécessiter 1 ou 2 jours d'hospitalisation.

La douleur au niveau de l'incision est habituellement minime et temporaire.

Les bains sont déconseillés jusqu'à ce que la cicatrisation soit obtenue. Des soins locaux à domicile peuvent être prescrits.

Pendant quelques semaines, la bourse reste augmentée de volume et une petite tuméfaction autour du

testicule peut parfois persister, correspondant à la zone opératoire.

La reprise scolaire, la convalescence ou l'arrêt de travail sont adaptés au cas par cas.

Une consultation de contrôle avec votre urologue est prévue quelques semaines après l'intervention.

Risques et complications

Dans la majorité des cas, l'intervention qui vous est proposée se déroule sans complication. Cependant, tout acte chirurgical comporte un certain nombre de risques et complications décrits ci-dessous :

- ◆ Certaines complications sont liées à votre état général et à l'anesthésie ; elles vous seront expliquées lors de la consultation pré-opératoire avec le médecin anesthésiste ou le chirurgien et sont possibles dans toute intervention chirurgicale.
- ◆ Les complications directement en relation avec l'intervention sont rares mais possibles :
 - Hématome : un saignement après l'intervention peut conduire à la constitution d'un hématome de la bourse, éventuellement étendu aux organes génitaux externes; une réintervention pour drainer l'hématome peut être nécessaire.
 - Retard de cicatrisation qui peut nécessiter des soins locaux prolongés.
 - Infection : l'existence d'un écoulement par l'incision, de signes d'infection généraux comme de la fièvre, ou locaux comme une inflammation de la bourse, peuvent entraîner la mise en route d'un traitement antibiotique adapté et le traitement d'un éventuel abcès par votre chirurgien.
 - Atrophie testiculaire : elle est de survenue exceptionnelle après chirurgie du kyste du cordon.
 - Récidive : son risque est extrêmement faible.

Il est rappelé que toute intervention chirurgicale comporte un certain nombre de risques y compris vitaux, tenant à des variations individuelles qui ne sont pas toujours prévisibles. Certaines de ces complications sont de survenue exceptionnelle et peuvent parfois ne pas être guérissables. Au cours de cette intervention, le chirurgien peut se trouver en face d'une découverte ou d'un événement imprévu nécessitant des actes complémentaires ou différents de ceux initialement prévus, voire une interruption du protocole prévu.

* L'Association Française d'Urologie n'assume aucune responsabilité propre en ce qui concerne les conséquences dommageables éventuelles pouvant résulter de l'exploitation des données extraites des documents, d'une erreur ou d'une imprécision dans le contenu des documents.

Votre urologue se tient à votre disposition pour tout renseignement.